

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**  
**Нафтифин Медисорб**

**Регистрационный номер:** ЛП-№(004398)-(РГ-РУ)

**Торговое наименование:** Нафтифин Медисорб

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** нафтифин

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения

**Состав**

1 мл содержит:

*Действующее вещество:* нафтифина гидрохлорид 10,0 мг

*Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль, этанол (спирт этиловый 95%), вода очищенная

**Описание:** прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор с запахом этанола.

**Фармакотерапевтическая группа:** противогрибковые средства, применяемые в дерматологии; противогрибковые средства для наружного применения; другие противогрибковые средства для наружного применения.

**Код АТХ:** D01AE22

#### **Фармакологические свойства**

##### **Фармакодинамика**

Нафтифин – противогрибковое средство для наружного применения, относящееся к классу алиламинов. Механизм действия связан с ингибированием сквален-2,3-эпоксидазы, что приводит к снижению образования эргостерола, входящего в состав клеточной стенки гриба. Активен в отношении дерматофитов, таких как *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*, плесневых грибов (*Aspergillus spp.*), дрожжевых грибов (*Candida spp.*, *Pityrosporum*) и других грибов (например, *Sporothrix schenckii*). В отношении дерматофитов и аспергилл нафтифин действует фунгицидно. В отношении дрожжевых грибов препарат проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма. Обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызвать вторичные бактериальные инфекции. Обладает противовоспалительным действием, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, особенно зуда.

##### **Фармакокинетика**

При наружном применении нафтифин хорошо проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях, что делает возможным применение препарата один раз в день.

#### **Показания к применению**

- грибковые инфекции кожи и кожных складок (*tinea corporis*, *tinea inqualis*);
- межпальцевые микозы (*tinea manum*, *tinea pedum*);
- грибковые инфекции ногтей (онихомикозы);
- кандидозы кожи;
- разноцветный (отрубевидный) лишай;
- дерматомикозы (с сопутствующим зудом и без него).

Препарат Нафтифин Медисорб эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос.

#### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к нафтифину или другим компонентам препарата;
- нанесение на раневую поверхность;
- беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены) (см. раздел «Применение при беременности и в период грудного вскармливания»).

#### **С осторожностью**

Детский возраст (опыт клинического применения ограничен).

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данных категорий пациентов не изучена) (см. раздел «Противопоказания»).

#### **Способ применения и дозы**

Наружно.

*При поражении кожи*

Препарат Нафтифин Медисорб наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания.

Длительность терапии при дерматомикозах – 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах – 4 недели.

*При поражении ногтей*

Препарат Нафтифин Медисорб наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей.

Длительность терапии при онихомикозах – до 6 месяцев.

Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

#### **Побочное действие**

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Нежелательные реакции носят обратимый характер и не требуют отмены лечения.

#### **Передозировка**

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

При случайном приеме внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

#### **Особые указания**

Препарат Нафтифин Медисорб не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания в глаза.

Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение.

*Вспомогательные вещества*

Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызывать раздражение кожи; при появлении нежелательных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат Нафтифин Медисорб не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Форма выпуска**

Раствор для наружного применения 1 %.

По 10, 20 или 30 мл во флаконы из коричневого стекла для лекарственных средств, закупоренные пробкой-капельницей из полиэтилена низкого давления и крышкой навинчиваемой, или крышкой с контролем первого вскрытия, или крышкой-капельницей из полиэтилена, или полипропилена, или полиэтилена низкого давления и полипропилена.

Один заполненный и укупоренный флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель:**

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел. (8332) 22-01-26

www.k-ff.ru

#### **Владелец регистрационного**

#### **удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей:**

Акционерное общество «Медисорб»

Юридический адрес: 614101, Пермский край, г.о. Пермский,

г. Пермь, ул. Причальная, д. 1б, к. 1

Тел/факс: (342) 259-41-41

E-mail: [info@medisorb.ru](mailto:info@medisorb.ru)

[www.medisorb.ru](http://www.medisorb.ru)