

Инструкция

по медицинскому применению препарата
Папаверина гидрохлорид МС

Регистрационный номер: P N001606/01

Торговое название препарата: Папаверина гидрохлорид МС

МНН или группировочное название: папаверин

Лекарственная форма: таблетки.

Состав:

1 таблетка содержит:

активное вещество: папаверина гидрохлорид 40 мг;

вспомогательные вещества: сахараза – 236,5 мг, крахмал – 70 мг, кальция стеарат – 3,5 мг.

Описание:

Таблетки белого цвета с риской.

Фармакотерапевтическая группа: спазмолитическое средство.

Код АТХ: A03AD01

Фармакологическое действие

Спазмолитическое средство, оказывает гипотензивное действие. Ингибирует фосфодиэстеразу, вызывает накопление в клетке цикло-аденозинмонофосфата и снижение содержания Ca^{2+} ; снижает тонус и расслабляет гладкие мышцы внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, дыхательной и мочеполовой системы) и сосудов. В больших дозах снижает возбудимость сердечной мышцы и замедляет внутрисердечную проводимость. Действие на центральную нервную систему выражено слабо (в больших дозах оказывает седативный эффект).

Фармакокинетика

Абсорбция зависит от лекарственной формы. Биодоступность в среднем – 54 %. Связь с белками плазмы – 90 %. Хорошо распределяется, проникает через гистогематические барьеры. Метаболизируется в печени. Период полувыведения – 0,5–2 ч (может удлиняться до 24 ч). Выводится почками в виде метаболитов. Полностью удаляется из крови при гемодиализе.

Показания к применению

Папаверин применяют при спазмах гладких мышц:

-органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная колика);

-периферических сосудов (эндартериит);

-сосудов головного мозга;

-сосудов сердца - стенокардия (в составе комплексной терапии);

-бронхоспазме.

В качестве вспомогательного лекарственного средства для премедикации.

Противопоказания

- гиперчувствительность;

- атриовентрикулярная блокада;

- глаукома;

- тяжелая печеночная недостаточность;

- пожилой возраст (риск развития гипертермии);

- детский возраст (до десяти лет).

С осторожностью назначают пациентам после черепно-мозговой травмы, при хронической почечной недостаточности, недостаточности функции надпочечников, гипотиреозе, гиперплазии предстательной железы, наджелудочковой тахикардии, шоковых состояниях.

При беременности и лактации безопасность препарата не установлена.

Способы применения и дозы

Папаверин принимают внутрь по 40–60 мг 3–4 раза в сутки (взрослые). Высшая разовая доза – 200 мг, суточная – 600

мг.

Детям в возрасте 10-14 лет – 20 мг (1/2 таблетки).

Побочное действие

Со стороны кожных покровов: аллергические реакции.

Со стороны пищеварительного тракта: запор, повышение активности «печеночных» трансаминаз.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия, снижение артериального давления. Со стороны системы кровотока: эозинофилия.

Со стороны центральной нервной системы: сонливость.

Передозировка

Симптомы передозировки: диплопия, слабость, снижение артериального давления, сонливость.

Лечение: симптоматическое (поддержание артериального давления).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно усиление гипотензивного эффекта папаверина при совместном применении с трициклическими антидепрессантами, прокаиномидом,

резерпином, хинидином.

Спазмолитическое действие папаверин усиливается при одновременном применении с барбитуратами.

При одновременном применении папаверина снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метилдопы.

Особые указания

В период лечения прием этанола должен быть исключен.

Вазодилатирующее действие препарата снижается при табакокурении.

Форма выпуска

Таблетки по 40 мг в упаковке по 10 штук.

По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке из бумаги с полимерным покрытием.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги с полимерным покрытием.

1, 2, 3, 5, 10 контурных безъячейковых или ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в пачку.

Контурные упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

Список Б.

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 С.

В недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта врача.

Производитель

Акционерное общество

«Медисорб»

Юридический адрес:

614113, Россия, г. Пермь,

ул. Гальперина, 6

Адрес места осуществления

производства: 614113,

г. Пермь, ул. Причальная, д. 16

Организация, принимающая

претензии от потребителей:

АО «Медисорб» 614113,

Россия, г. Пермь,

ул. Гальперина, 6

Тел/факс: (342) 259-41-41

E-mail: info@medisorb.ru

www.medisorb.ru

