

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС ТАБЛЕТКИ 250 МГ

Регистрационный номер: P N001289/01

Торговое наименование препарата:

Уголь активированный МС.

Международное непатентованное или группировочное название:

Активированный уголь.

Лекарственная форма: Таблетки.

Состав:

1 таблетка содержит:

активное вещество:

уголь активированный 250 мг

вспомогательное вещество:

крахмал картофельный

Описание: Таблетки черного цвета плоскоцилиндрические с фаской, слегка шероховатые.

Фармакотерапевтическая группа:

Энтеросорбирующее средство.

Код АТХ: [A07BA01]

Фармакологическое действие

Препарат обладает адсорбирующим и неспецифическим детоксикационным действием. В просвете желудочно-кишечного тракта уголь активированный связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, в том числе бактерии и бактериальные токсины, пищевые аллергены, лекарственные препараты, яды, алкалоиды, соли тяжелых металлов, газы.

Фармакокинетика

Не всасывается, не расщепляется, выделяется полностью через желудочно-кишечный тракт в течение 24 часов.

Показания к применению

- применяют в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения;
- при комплексном лечении пищевой токсикоинфекции, сальмонеллёза, дизентерии;
- при отравлении лекарственными препаратами (психотропными,

снотворными, наркотическими средствами и др.), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другим ядами;

- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся диспепсией, метеоризмом;
- при пищевой и лекарственной аллергии;
- при гипербилирубинемии (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемии (почечная недостаточность);
- для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуковым и рентгенологическим исследованием.

Противопоказания

Обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, атония кишечника; индивидуальная непереносимость препарата, одновременное назначение антикоагулянтных лекарственных средств, эффект которых развивается после всасывания (метионин и др.).

Способы применения и дозы

Внутрь в таблетках или после предварительного измельчения в виде водной взвеси, за час до еды и приема других лекарственных средств. Необходимое количество препарата размешивают в 1/2 стакана воды.

Режим дозирования взрослым в среднем по 1,0-2,0 г (4-8 таблеток) 3-4 раза в сутки, максимальная разовая доза для взрослых до 8.0 г. Детям препарат назначают в среднем из расчёта 0,05 г/кг массы тела 3 раза в сутки, максимальная разовая доза до 0,2 г/кг массы тела.

Курс лечения при острых заболеваниях 3-5 дней. При аллергии и хронических заболеваниях – до 14 дней. Повторный курс – через 2 недели по рекомендации врача.

При острых отравлениях лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, затем дают внутрь 20-30 г препарата.

При метеоризме назначают внутрь по 1,0-2,0 г (4-8 таблеток) препарата 3-4 раза в день. Курс лечения 3-7 дней.

Побочное действие

Запор, диарея. При длительном применении (более 14 дней) возможно снижение всасывания кальция, витаминов, питательных веществ. Окрашивание кала в темный цвет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Активированный уголь снижает эффективность лекарственных препаратов, применяемых внутрь одновременно с ним.

Особые указания

При лечении интоксикации необходимо создать избыток угля активированного в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации угля активированного в среде способствует десорбции связанного вещества в просвет кишечника и его всасыванию в кровь; для предупреждения резорбции рекомендуется повторное промывание желудка с углем активированным и назначение угля активированного внутрь. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо применять уголь активированный в течение нескольких дней. При использовании препаратов более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция. Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно

влажном) снижает сорбционную способность.

Форма выпуска

Таблетки 250 мг.

По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке.

По 1, 2, 3, 5 или 10 контурных упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается помещать контурные упаковки с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года. По истечении срока годности препарат не должен применяться.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта.

Производитель:

Акционерное общество

«Медисорб»

614113, Россия, г. Пермь,

ул. Гальперина, 6

Адрес места осуществления

производства: 614113, г. Пермь,

ул. Причальная, д. 16

Организация, принимающая

претензии от потребителей:

АО «Медисорб» 614113, Россия,

г. Пермь, ул. Гальперина, 6

Тел./факс: (342) 259-41-41;

(342) 259-41-47

E-mail: info@medisorb.ru

www.medisorb.ru



МЕДИСОРБ